



ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

“Gheorghe Ionescu-Șișești”

B-dul Mărăști 61, 011464, București, România

Tel: +40-21-3184450; 3184451; Fax: +40-21-3184478;

E-mail: relatii@asas.ro Internet: <http://www.asas.ro>

JURNALUL ZILEI

Starea de fapt la data de 25 ianuarie 2018.

A. Pomicultura

o Temperatura în zonele pomicele (minimele zilnice): ICDP Pitești, Mărăcineni -7,1°C; SCDP Băneasa -7,9°C ; Bistrița -5,8°C; SCDP Constanța -6,1°C; CCDCPN Dăbuleni -9,0°C; SCDP Iași -12,3°C; SCDH Târgu Jiu -6,7°C; SCDP Voinești -9,4°C.

o Pornirea în vegetație: NU, excepție soiul de migdal Sandi de la SCDP Constanța.

o Pierderi : NU

o Sursele de informare: pentru datele meteo ANM București și pentru fenologie ICDP Pitești, SCDP Bistrița, Constanța, Iași, Voinești, Băneasa, CCDCPN Dăbuleni și SCDH Tg. Jiu.

B. Viticultura

o **Temperatura în zonele viticole** (minima absoluta): I. Podisul Transilvaniei (podgoria Tarnave -6,0 °C), II. Dealurile Moldovei (podgoria Iasi -19,7 °C, podgoria Odobesti -9,2 °C, podgoria Dealul Bujorului -12,0 °C), III. Dealurile Munteniei si Olteniei (podgoria Dealu mare/centrul viticol Pietroasa -6,5 °C, centrul viticol Valea Calugareasca -7,0 °C, podgoria Stefanesti -7,1 °C), V.Crisana si Maramures (podgoria Minis-Maderat -4,0 °C), VI. Colinele Dobrogei (-7,2 °C).

o **Pornirea in vegetatie:** NU

o **Pierderi:** NU.

Sunt posibile pierderi de ochi, in podgoria Iasi, in special la soiurile pentru struguri de masa. Se vor recolta probe de coarde si efectua determinari privind viabilitatea ochilor (mugurilor de rod). Estimarea eventualelor pierderi va fi comunicata la inceputul saptamanii viitoare.

o **Sursele de informare:** ICDVV Valea Calugareasca, SCDVV Blaj, Bujoru, Iasi, Minis, Murfatlar, Odobesti, USAMV Bucuresti-SCDVV Pietroasa filiala, INCDBH Stefanesti

C. Culturi de câmp

o Temperaturile afișate pe site-ul <<http://www.meteoromania.ro/anm2/>> nu indică valori de natură să pună probleme culturilor de câmp cu posibila excepție a depresiunilor și a zonelor centrale (Bacău -13°C) și nordice din Moldova (Botoșani -16°C) .

o Fundulea: maxima -1,5°C, minima: -10,7°C, grosimea stratului de zăpadă: 3 cm.

o Strat de zăpadă

Grâu și orz

o **stare de vegetație:** Staționar (Grâul și orzul sunt răsărite cu excepția unor suprafețe ne semnificative semănate foarte târziu. Semănăturile efectuate până la jumătatea lunii octombrie sunt în faza de înfrățire. Cerealele de toamnă sunt în stadiul de repaus vegetativ, în cea mai mare parte a țării)

o **Atac de boli și dăunători** Staționar (Nu se manifestă atacuri semnificative de boli și dăunători. Sporadic se observă îngălbeniri foliare, legate de deficiențe nutriționale cauzate de levigarea produsă de precipitațiile abundente, mai ales pe solele cu aprovizionare mai slabă cu azot și la densități ridicate.)

o **Pierderi:** Reduceri ale aparatului foliar și posibile reduceri de densitate în jumătatea nordică a Moldovei în special în parcelele cultivate cu genotipuri sensibile, pentru parcelele cultivate cu genotipuri rezistente la ger și în care s-a aplicat o tehnologie corectă exista posibilitatea de refacere.

Rapiță

o **stare de vegetație:** Staționar (Culturile de rapiță sunt în majoritate răsărite, dar densitatea este pe alocuri neuniformă acolo unde s-a semănat în teren uscat. Culturile semănate prea timpuriu îndeosebi la unele genotipuri, pot fi prea avansate în dezvoltare, ceea ce le face vulnerabile la eventuale temperaturi mai scăzute).

o **Atac de boli și dăunători** : Staționar (Nu se manifestă atacuri semnificative de boli și dăunători.)

o **Pierderi:** Reduceri ale aparatului foliar și posibile reduceri de densitate în jumătatea nordică a Moldovei în special la culturile mai avansate în vegetație.